

Biocid

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

ATAK DELTACAPS 50 CS

Tekutý emulgovatelný insekticidní koncentrát určený k aplikaci postřikem proti lezoucímu hmyzu v ochranné dezinsekcí. Přípravek má rychlou okamžitou i reziduální účinnost.

Kategorie uživatelů: Neprofesionální uživatel
Biocidní přípravek: insekticid, TP 18
Distribuční kategorie: II, biocid bez distribuční registrace

Účinná látka: deltamethrin 50 g/l (5%)

MZDR: MZDR 33746/2013/SOZ

Povolení/Oznámení je vystaveno na název produktu: Deltacaps 50 CS

Uvedený název ATAK: Marketingové označení řady biocidů společnosti AgroBio Opava

Držitel povolení: Sharda Europe b.v.b.a., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Belgium

Distributor pro ČR: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Skrochovice, 747 71 Brumovice

Balení: 25 ml a 50 ml v PET láhvi

Varování:

H226 Hořlavá kapalina a páry. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 - Obsahuje 2,2-iminodi(etha-1-amin); diethylentriamin, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 - Používejte ochranné brýle, ochranný oděv, ochranné rukavice. P391 - Uniklý produkt seberte P501

Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu s místními, národními nebo mezinárodními předpisy.

Mechanismus účinnosti:

Deltamethrin, účinná látka přípravku Deltacaps 50 CS patří mezi syntetické pyreetroidy, působí na hmyz kontaktně a má rychlý nástup účinnosti i dlouhou reziduální účinnost. Účinná látka přípravku se neodpařuje.

Návod k použití:

Přípravek naředte vodou na 1% pracovní směs. Při použití 5 litrového postřikovače nalejte do nádrže asi 1-2 litry vody, přidejte 50 ml přípravku a doplňte vodou do 5 litrů. Dobře promíchejte, postřikovač natlakujte a aplikujte postřikem v dávkách 50 ml naředěného přípravku na každý m² ošetřené plochy. Postřík aplikujte přímo na hmyz, na místa výskytu a předpokládaného výskytu, na jeho cestičky a do jeho úkrytů. Na podlahu kolem stěn, do koutů, kolem podlahových lišt, do škvír a prasklin apod.

Zasažený hmyz uhynie za 1 až 24 hod. Při přetrvávajícím zamoření postřík opakujte podle potřeby v jednoměsíčních intervalech. Po postřiku zajistěte důkladné větrání. Prostory mohou být znovu používány a lidé do nich mohou vstupovat po dokonalém zaschnutí postřiku, minimálně za 2 hod.

Pokud byly postřikem kontaminovány povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami nebo krmivy, omyjte je důkladně vodou a saponátem.

Bezpečnostní opatření:

Přípravek nesmí být v rozporu s touto etiketou používán k jinému účelu, ani jiným způsobem, ani v rozporu s platnými právními předpisy. Před použitím si přečtěte návod k použití.

Postřík nesmí být aplikován na potraviny, jídelní přístroje, kuchyňská zařízení a na povrchy, které přicházejí do kontaktu s

potravinami, nápoji nebo krmivy a na povrchy, na nichž jsou potraviny a krmiva připravovány, podávány, konzumovány, nebo je na nich poskytováno občerstvení. Před postřikem odstraňte nebo dobře přikryjte akvária s rybičkami a rostliny. Kromě osob provádějících postřik, nesmí být v ošetřovaném prostoru žádné jiné osoby, domácí a hospodářská zvířata, až do zaschnutí postřiku a odvětrání. Nevylévejte do kanalizace. Přípravek je nebezpečný pro včely.

Postřik neaplikujte na elektrická zařízení, které jsou pod proudem. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Při práci s přípravkem noste ochranný pracovní oděv, rukavice a brýle. Nevdechujte aerosol vznikající při postřiku. V případě nedostatečného větrání používejte ochranný dýchací přístroj (např. masku s filtrem typu P1). Po ukončení práce si umyjte ruce vodou a mýdlem. Neznečišťujte vodní toky a vodní nádrže přípravkem. Nevylévejte do kanalizace. Před opětovným použitím ontaminovaný ochranný oděv vyperte. Neaplikujte přímo na zvířata. Zamezte uvolnění do životního prostředí. Uniklý přípravek shromážděte. Odstraňte obsah a kontaminovaný obal v souladu se zákonem.

První pomoc:

První pomoc – všeobecně : Osobě v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc (pokud možno ukažte lékaři etiketu z výrobku).

První pomoc při vdechnutí : Přemístěte zasaženou osobu z kontaminované oblasti na čerstvý vzduch. Pokud postižená osoba nedýchá, zahajte umělé dýchání. Přivolejte lékaře.

První pomoc při kontaktu s kůží : Odstraňte kontaminovaný oděv. Po kontaktu s pokožkou ihned důkladně opláchněte vodou s mýdlem.

První pomoc při kontaktu s okem : Omývejte velkým množstvím vody (po dobu aspoň 20 minut) s široce otevřenýma očima a po vyjmutí měkkých kontaktních čoček, poté ihned vyhledejte lékaře.

První pomoc při požití : Vypláchněte ústa. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

Přímé a nepřímé vedlejší účinky

Lokální: může způsobit podráždění očí a kůže. Při vdechnutí: může vyvolat kašel a podráždění. Systémové: rozrušení, žaludeční a střevní potíže, třes, závratě, bolest hlavy, apatie, nevolnost a zvracení. **V případě nehody nebo když se necítíte dobře, vyhledejte neprodleně lékařské ošetření.**

Při zasažení kůže: Omyjte zasažené místo kůže ihned velkým množstvím vody a mýdlem. Sundejte kontaminovaný oděv a znovu jej použijte po vyprání. Jestliže podráždění zasažené kůže přetrvává vyhledejte lékařské ošetření. **Při zasažení očí**: Vyjměte kontaktní čočky, pokud je máte. Široce otevřené zasažené oko/oči vyplachujte velkým množstvím vody po dobu 15 minut. **Při nadýchání**: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a poskytněte mu klid. Jestliže je jeho dýchání nepravidelné, vyhledejte lékařské ošetření. **Při polknutí**: Vypláchněte ústa vodou, zvracení vyvolávejte jen po konzultaci s lékařem. Nepodávejte nic ústy, jestliže je postižený v bezvědomí. Vyhledejte lékařské ošetření.

Informace pro lékaře:

Deltamethrin patří k toxinům sodíkových kanálů, snižuje práh citlivosti senzorických nervů a způsobuje prodloužení neuronové excitace.

Protijed: není. Použijte symptomatické léčba.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (případně i následnou terapii) konzultovat s **Toxikologickým informačním střediskem**, Klinika nemocí z povolání, Vyšehradská 49, Praha 1, 128 21, tel: 224 919 293, nebo 224 915 402.

Skladování: Skladujte na suchém místě. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech, v chladných, suchých a dobře větraných a uzamykatelných prostorách při teplotě od 0 – 30°C. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv, hnojiv, těkavých chemických látek a jejich obalů. Uchovávejte mimo dosah dětí, nepovolaných osob a domácích zvířat. Chraňte před kontaktem s tepelnými zdroji nevystavujte přímému slunečnímu svitu a teplotám vyšším než 40°C. Chraňte před mrazem.

Odstraňování obalů a zbytků přípravku:

Prázdné obaly, které přišly do kontaktu s přípravkem a zbytky přípravku musí být likvidovány jako nebezpečný odpad podle platných právních předpisů.

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby.