

# IMIDASECTANTS



## ► GELOVÁ NÁSTRAHA PROTI MRAVENCŮM

IMIDACLOPRID 0,1g/kg (0.01%)

**Upozornění: PŘED POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TUTO ETIKETU.** Dodržujte přesně návod k použití, bezpečnostní opatření a doporučené dávkování a všechny podmínky bezpečného používání. Přípravek používejte pouze k účelům, pro které je určen. Při používání gelu by měla být dodržována všechna pravidla bezpečnosti práce, za níž máte plnou zodpovědnost, s ohledem na všechny faktory a podmínky, v nichž je gel aplikován. Výrobce zodpovídá za kvalitu a účinnost přípravku jen v případě, že byl prodán v originálním balení, skladován a používán doporučeným způsobem.

MZDR 21644/2013/SOZ

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

**První pomoc:** Kontaminovaný oděv ihned svlékněte.

Při kontaminaci kůže umyjte ihned velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení oka/očí vypláchněte ihned vodou a kontaktujte lékaře. Při náhodném polknutí vyhledejte ihned lékařské ošetření.

První pomoc a léčbu můžete konzultovat 24 hod. denně s Toxikologickým střediskem, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 91 92 93.

Nástraha k přímému použití proti mravencům faraónům (*Monomorium pharaonis*), mravencům drnovým (*Tetramorium caespitum*), mravencům obecným (*Lasius niger*) a mravencům domácím (*Lasius emarginatus*)

**Mechanismus účinnosti:** Účinná látka imidacloprid patří mezi nitroguanidiny a v těle hmyzu se váže na neurony. Tato vazba narušuje přenos nervových impulsů, což je pro zasažené hmyz smrtelné.

Mravenci jsou lákáni potravinami atraktanty obsaženými v gelu. Dělnice donášejí gel do hnízd a distribuují je mezi ostatní příslušníky kolonie. Gel účinkuje pozřením i kontaktně na larvy i dospělé mravence.

**Návod k použití:** Ve vnitřních prostorách umístěte gel ve formě kapek nebo tenkých linek na místa, kde se mravenci vyskytují, tj. do blízkosti cestiček mravenců, do blízkosti míst, kde vyhledávají potravu a vodu, do blízkosti míst, kde pronikají do místnosti, nebo do blízkosti vchodů do jejich hnízd. V místech, kde je jen podezření na výskyt mravenců, nebo kde se mravenci vyskytují zřídka, umístěte gel do vhodné insekticidní staničky.

Mimo vnitřní prostory umístěte gel ve formě kapek nebo tenkých linek do hnízd mravenců, nebo na jejich cestičky jen v případě, že mravenci pronikají do vnitřního prostoru. V případě, že jde jen o podezření na výskyt a aktivitu mravenců, umístěte gel do insekticidních staniček, aby byl chráněn před deštěm a jinými vnějšími vlivy.

Kde je to možné, odstraňte všechny ostatní zdroje potravy mravenců, aby mravenci ochotněji gel konzumovali.

**Účel použití:** Nástraha IMIDASECT ANTS je určena k použití v těchto podmínkách: V obytných prostorách: zejména v kuchyních. V potravinářských provozovnách: výrobnách, kuchyních veřejného stravování, jatkách, skladech, prodejních, restauračních apod. Ve veřejných budovách: ve zdravotnických zařízeních, hotelích apod.

**Dávkování:** Ve vnitřních prostorách: Mravenec faraón a mravenec drnový: 1-2 kapky gelu na 1 m<sup>2</sup>. Mravenec obecný a mravenec domácí: 1 kapka gelu na 1 m jejich cestičky. Aplikované kapky gelu by měly mít asi 1 cm v průměru (přibližně 0,2 g).

**Ve venkovním prostoru:**

Použijte pouze proti mravencům, kteří pronikají do vnitřního prostoru. Mravenec obecný a mravenec domácí: 1 kapka gelu do blízkosti vchodu do hnízda nebo do blízkosti cestičky mravenců. Aplikovaná kapka by měla mít průměr asi 1 cm (asi 0,2g).

**Poznámky:**

Neaplikujte na místa, která jsou pravidelně uklizena a při úklidu by mohl být gel přemístěn na místa, kde by mohl přijít do kontaktu s potravinami, nebo zničen. Neaplikujte na místa, která jsou pravidelně omývána vodou, protože voda gel poškodí. Neaplikujte gel na místa čerstvě ošetřená postřikem insekticidů. Aplikovaný gel nepostřikujte žádnými insekticidmi. Gel může poškozovat barvu textilních tkanin.

**Bezpečnostní opatření:** Po práci s přípravkem IMIDASECT ANTS a před jídlem si umyjte ruce vodou a mýdlem. Neaplikujte do blízkosti nebalených potravin. Neaplikujte gel na povrchy na nichž jsou potraviny skladovány, připravovány nebo konzumovány. Během aplikace chraňte potraviny, nádoby a jídelní přístroje před kontaminací gelem. Neaplikujte gel na místa přístupná dětem a domácím zvířatům. Zabraňte kontaminaci vodních nádrží, vodních toků.

**Skladování:** Skladujte v originálních obalech v suchých, chladných, uzamčených skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, léků a chemických látek. Nevystavujte přímému slunečnímu svítu a teplotám vyšším než 40° C. Chraňte před mrazem.

**Odstraňování obalů a zbytků přípravku:** Přípravek z obalu úplně spotřebujte. Prázdný obal nepoužívejte ani po vypláchnutí k jiným účelům. Prázdné obaly a zbytky přípravku odstraňujte jako nebezpečný odpad.



Číslo šarže a datum výroby: viz obal.

Doba použitelnosti 4 roky od data výroby.

Balení: 5 g

**Výrobce:** SHARDA Europe b.v.b.a.

Jozef Mertensstraat 142,  
1702 Dilbeek  
BELGIQUE

**Dovozce a distributor v ČR:**

**Samura s.r.o.**

Ke Klíčovu 8, Praha 9  
190 00 Czech Republic  
Tel.: +420 244 911 220  
www.samura.cz

